

Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi

Infusionslösung

- Solution pour perfusion

Aqua-Dest

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Arzneimittels zu beachten ist.

Gebrauchsinformation

aqua ad iniectabilia DeltaSelect

Zusammensetzung

1000 ml Flüssigkeit enthalten:

Wasser für Injektionszwecke	1000 ml
pH-Wert	5,3 - 7,0

Darreichungsform und Menge

aqua ad iniectabilia DeltaSelect ist in Packungen mit

- 20 Injektionsflaschen zu 50 ml (Glas)
- 20 Injektionsflaschen zu 100 ml (Glas)
- 10 Infusionsflaschen zu 100 ml (Plastik)
- 20 Infusionsflaschen zu 100 ml (Glas)
- 10 Infusionsflaschen zu 250 ml (Glas)
- 10 Infusionsflaschen zu 500 ml (Glas und Plastik)
- 6 Infusionsflaschen zu 1000 ml (Glas)
- 10 Infusionsflaschen zu 1000 ml (Plastik) erhältlich.

Lösungs- und Verdünnungsmittel

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer

DeltaSelect GmbH
Benzstraße 5
72793 Pfullingen
Tel.: 0 71 21/99 21-0
Fax: 0 71 21/99 21-31

Anwendungsgebiete

Zum Auflösen und Verdünnen von Arzneimitteln.

Gegenanzeigen

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Nicht zur alleinigen intravenösen Anwendung bestimmt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zum Auflösen und Verdünnen von Arzneimitteln unmittelbar vor Gebrauch.

Nicht für die alleinige intravenöse Anwendung bestimmt.

Dosierung und Anwendungsdauer richten sich nach den entsprechenden Angaben für das gelöste/verdünnte Arzneimittel.

DeltaSelect

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn *aqua ad iniectionabilia* DeltaSelect in zu großen Mengen angewendet wurde?

Symptome der Intoxikation (z. B. versehentliche Infusion)

Die Intoxikation (Vergiftung) ist gekennzeichnet durch eine hypotone Hyperhydratation (Süßwasservergiftung), Hirnödem, Lungenödem, Elektrolytstörungen bis hin zum Kammerflimmern und eine akut eintretende intravasale Hämolyse (Auflösung der roten Blutkörperchen im Blutgefäß), welche zum Nierenversagen und zum Tod führen kann.

In Abhängigkeit von Infusionsgeschwindigkeit und -menge treten Schüttelfrost, Schmerzen über der Brust und im Rücken sowie Dyspnoe (Atemnot) auf.

Therapie von Intoxikationen:

Sofortiges Abbrechen der Infusion.

Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt sind nach Maßgabe der entsprechenden Laborparameter zu korrigieren. Tritt eine massive Hämolyse auf, müssen intensivmedizinische Maßnahmen sofort eingeleitet werden.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht bekannt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und dem Karton aufgedruckt. Nach diesem Datum sind die Lösungen nicht mehr zu verwenden.

Der Flascheninhalt soll klar und das Behältnis unbeschädigt sein.

Nach Anbruch des Behältnisses muss *aqua ad iniectionabilia* DeltaSelect sofort verwendet werden.

Restmengen sind zu verwerfen!

Es ist darauf zu achten, dass *aqua ad iniectionabilia* DeltaSelect so aufbewahrt wird, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist.

Stand der Information:

Juni 1999

DeltaSelect

Ein Unternehmen
der PlasmaSelect AG



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch